



# DIÁRIO OFICIAL PORTO ALEGRE

Órgão de Divulgação do Município - Ano XXV - Edição 6366 - Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020.

**Divulgação:** Quarta-feira, 21 de Outubro de 2020. **Publicação:** Quinta-feira, 22 de Outubro de 2020.

## Executivo - DOCUMENTOS OFICIAIS

### Documentos Oficiais

#### Secretaria Municipal de Saúde

**Protocolo: 303073**

### NOTA TÉCNICA 010/2020 PROCESSO 20.0.000085122-2

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 89 e inciso VI do artigo 161 da Lei Orgânica do Município, considerando a PORTARIA/SES/RS Nº 670/2010, quanto ao uso e dose máxima dispensada para o medicamento **Finasterida**, disponível nas Farmácias Distritais do Município, na apresentação de **5 mg por comprimido**:

#### ORIENTA:

1. A dispensação do medicamento fica **RESTRITA** às seguintes indicações:

1.1 Hiperplasia prostática (CID N40): 5 mg por via oral uma vez ao dia, de forma isolada ou em combinação com um antagonista alfa-1-adrenérgico. São necessários de seis a doze meses de tratamento para melhora dos sintomas. Reservar o uso para pacientes com significativo aumento do volume prostático, os intolerantes ou os refratários aos antagonistas alfa-1-adrenérgicos (p. ex. doxazosina) ou para aqueles com hematúria associada à hiperplasia prostática benigna. É indispensável a apresentação da receita médica contendo o CID para a dispensação do medicamento.

1.2 Dose máxima: Tendo em vista as doses recomendadas para as indicações previstas nesta nota técnica, e com base nos dados encontrados na literatura, a dose diária máxima cadastrada no sistema DIS é de 5 mg/dia (1 comprimido por dia). Doses superiores às recomendadas somente serão dispensadas através de justificativa escrita pelo prescriptor e avaliação pelo farmacêutico.

2. Disponibilidade e apresentação: Este medicamento está disponível em todas as Farmácias Distritais na apresentação de comprimidos de 5 mg.

3. Contraindicações:

Hipersensibilidade à finasterida ou a qualquer um dos componentes da formulação; gravidez ou mulheres com potencial para engravidar.

4. Precauções:

Insuficiência hepática: utilizar com cuidado em pacientes com insuficiência hepática; finasterida é amplamente metabolizado no fígado.

Câncer de próstata: quando comparado ao placebo, inibidores da 5-alfa-redutase (5-ARIs) foram associados a um aumento na incidência de câncer de próstata de alto grau; 5-ARIs por esse motivo não são aprovados nos Estados Unidos ou Canadá para a prevenção do câncer de próstata.

Duração da terapia: um mínimo de 6 meses de tratamento pode ser necessário para determinar se um indivíduo responderá à finasterida.

Monitoramento do antígeno prostático específico (PSA): redução dos níveis de PSA em aproximadamente 50% dentro de 6 meses de tratamento. Para interpretação, um novo PSA deve ser feito em período igual ou maior de 6 meses após o início do tratamento e monitorado periodicamente depois disso. Um aumento confirmado de PSA durante o uso deste medicamento, mesmo se dentro dos limites normais, podem estar associados a um risco aumentado de câncer de próstata e devem ser avaliados. A finasterida não interfere nos níveis de PSA livre.

5. Referências Bibliográficas:

UpToDate [Internet]. *Finasteride: Drug information - UpToDate*. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/finasteride-drug-information/print?search=finasteride>. Acesso em: 28 de setembro de 2020.

DRUGS.com. Finasteride. Disponível em: <<https://www.drugs.com/ppa/finasteride.html>>. Acesso em 24 de setembro de 2020.

Porto Alegre, 01 de outubro de 2020.

**LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA**, Coordenador da Coordenação de Assistência Farmacêutica.  
**PABLO DE LANNOY STURMER**, Secretário Municipal de Saúde.



[Edição Completa](#)



Imprimir