



**Prefeitura de  
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIREÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE  
ÁREA TÉCNICA DA SAÚDE DA MULHER  
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM



Agosto/2023

## **Orientações e habilitações para Encaminhamento das Especialidades Ginecológicas e Obstétricas no GERCON**

### **Ao inserir paciente em uma agenda de especialidades no GERCON, qualificar as informações com:**

- Relato de anamnese e exame clínico compatível com encaminhamento (início de sintomas, intensidade, frequência, tipo de dor);
- História pregressa que tenha associação com motivo do encaminhamento;
- Antecedentes gineco-obstétricos (menarca, sexarca, data da última menstruação, anticoncepção, gestas);
- Descrição de exames complementares (anexar exames) caso houver.

### **1. Ginecologia Geral:**

**1.1** - Sangramento pós-menopausa; menometrorragia; mioma sub-mucoso com sangramento irregular; espessamento endometrial; dor pélvica crônica; suspeita de infertilidades; suspeita de endometriose (SOMENTE ENCAMINHAMENTO MÉDICO);

**1.2** - Encaminhamento para contracepção métodos reversíveis de longa ação (LARCs): Mulheres com dificuldade de adaptação aos métodos contraceptivos disponíveis na APS, priorizando: Multíparas; Usuária com filho anterior portador de malformações congênitas ou síndromes genéticas; Adolescentes em vida sexual ativa e que apresentam grandes dificuldades de adaptação ao uso de métodos contraceptivo; Adolescente com gestação prévia; Puérpera com gestação anterior sem pré-natal ou com baixa adesão ao pré-natal; Usuária HIV+ sem adesão à terapia antirretroviral; Usuária com vulnerabilidade social e/ou uso de drogas; Usuária HIV+ com RN sem informação final da conclusão da exposição ao HIV; Usuária sem tratamento adequado para sífilis durante a gestação; Usuária com doenças auto imunes em uso de imunomoduladores (interferon beta ou acetato de glatirâmer); Usuária com transtorno mental e/ou déficit cognitivo; Mulher com Doença Falciforme; Trans Homem (**MÉDICO E ENFERMEIRO**).

**1.3** - Prolapso genital; queixas de incontinência urinária (SOMENTE MÉDICO);



**1.4** - Colo uterino: se ao exame especular apresentar (mesmo que seja gestante): Lesão suspeita (como tumores ou úlceras); Achado em citopatológico NIC 2; ASC-US caso tenha dado alterado em exame de repetição dentro dos prazos previstos; Lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL) caso tenha dado alterado em exame de repetição dentro dos prazos previstos; Biópsia de colo do útero; ASC-US não podendo afastar lesão de alto grau (ASC-H); Atipias em células glandulares de significado indeterminado (AGC), possivelmente não neoplásico ou quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau; Lesão intraepitelial de alto grau (HSIL); Lesão intraepitelial de alto grau não podendo excluir microinvasão; Mulheres imunossuprimidas com lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL) ou células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas (ASC-US) **(MÉDICO E ENFERMEIRO)**;

**1.5** - Lesões suspeitas de câncer em exame ginecológico **(MÉDICO E ENFERMEIRO)**;

**1.6** - Suspeita clínica de câncer na pelve (sangramento anormal; dor e inchaço no abdome inferior) (SOMENTE MÉDICO);

**1.7** - Lesões suspeitas de câncer de vulva (lesões avermelhadas, amarronzadas, endurecidas, rugosas); linfonodos aumentados em região inguinal (SOMENTE MÉDICO);

**1.8** - Lesões compatíveis com HPV em região pélvica **(MÉDICO E ENFERMEIRO)**;

**1.9** - Cistos ovarianos não complicados na pós-menopausa (SOMENTE MÉDICO);

**1.10** - Paciente com sintomas importantes (calorões, insônia, depressão, irritabilidade, diminuição da libido, entre outros) que necessitem avaliação e tratamento (SOMENTE MÉDICO);

**1.11** - Disfunções sexuais (SOMENTE MÉDICO);

**1.12** - Dor na mama localizada (SOMENTE MÉDICO);

**1.13** – Ginecomastia (SOMENTE MÉDICO);

## **2. Ginecologia Cirurgia:**

**2.1** - Cistos ovarianos simples com mais de 5,0 cm ou complexos de qualquer tamanho (SOMENTE MÉDICO);

**2.2** - Retirada de DIU sem fio visível (SOMENTE MÉDICO);

**2.3** - Pólipo endometrial (SOMENTE MÉDICO);

**2.4** - Miomatose uterina sintomática (SOMENTE MÉDICO).

## **3. Ginecologia Ligadura Tubária:**

**3.1.** Laqueadura tubária, conforme estabelecido em lei: a partir de 21 anos ou dois filhos vivos. **(MÉDICO E ENFERMEIRO)**

Encaminhar usuária com:

- termo de consentimento [TERMO DE CONSENTIMENTO LT 2023.pdf](#) e



**Prefeitura de  
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIREÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE  
ÁREA TÉCNICA DA SAÚDE DA MULHER  
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM



- doc de avaliação clínica e psicossocial (PREENCHIDO POR DOIS PROFISSIONAIS DA Atenção primária). [Avaliação Clínica e Psicossocial para LT e Vasec \(1\) \(2\).docx](#)

**4. Ginecologia Infanto-Puberal:** Disfunções do trato genital e ou hormonais entre 0 a 18 anos. (SOMENTE MÉDICO)

#### **5. Oncologia Gineco:**

**5.1** - Resultado de exame citopatológico com: Carcinoma epidermoide invasor; Adenocarcinoma in situ (AIS) ou invasor (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**5.2** - Resultado de biópsia de colo com: Neoplasia invasora (carcinoma epidermoide/adenocarcinoma); Carcinoma microinvasor; NIC 3(**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**5.3** - Biópsia de colo do útero ou endométrio com diagnóstico de câncer (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**5.4** - Cistos ovarianos complexos de qualquer tamanho (SOMENTE MÉDICO);

**5.5** - Lesões suspeitas de câncer na pelve em exames complementares (SOMENTE MÉDICO).

#### **6. Oncologia Mama:**

**6.1** - Nódulo suspeito no exame clínico (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**6.2** - Espessamento, retração ou infiltração de pele (aspecto de casca de laranja) (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**6.3** - Inversão/retração do mamilo (repentinamente) (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**6.4** - Prurido areolar ou lesões areolares que costumam a cicatrizar (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**6.6** - Descarga mamilar sanguinolenta ou em “água de rocha” (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**6.7** - Úlcera de pele que não cicatriza (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**6.8** - Gânglios axilares pouco móveis, duros únicos ou múltiplos; (**MÉDICO E ENFERMEIRO**)

**6.9** - Mamografia e/ou ultrassonografia mamária (BIRADS 4 e 5) (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

#### **7. Ginecologia Mama:**

**7.1** - Nódulos sólidos não-suspeitos (palpáveis ou visíveis em exame complementar – BIRADS 3) que necessitem de investigação complementar, mesmo que seja gestante. (**MÉDICO E ENFERMEIRO**),



**Prefeitura de  
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIREÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE  
ÁREA TÉCNICA DA SAÚDE DA MULHER  
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM



**7.2** – Nódulo/cisto mamário maior que 2 cm ao exame de imagem (**MÉDICO E ENFERMEIRO**),

**7.3** - Cisto recorrente após punção, punção de nódulo cístico com líquido sanguinolento, abscesso recidivante, mamas supranumerárias sintomáticas, secreção mamilar espessa não sanguinolenta (**MÉDICO E ENFERMEIRO**).

**7.4** - Sinais ou sintomas de complicações relacionadas com prótese mamária (**MÉDICO E ENFERMEIRO**).

**7.5** - Pacientes com diagnóstico de neoplasia de mama que sofreram mutilação total ou parcial da mama em decorrência do tratamento do câncer, que desejam a reconstrução mamária, conforme Protocolos para Encaminhamento de Mastologia do Telessaude/RS. (**MÉDICO E ENFERMEIRO**)

[Protocolos de encaminhamento para Mastologia](#)

**8. Urologia Vasectomia:** Realização de vasectomia, conforme estabelecido em lei: a partir de 21 anos ou dois filhos vivos.

Encaminhar usuário com o termo de consentimento e o doc de avaliação clínica e psicossocial.

### **9. Pré Natal de Alto risco:**

9.1. Toxoplasmose IgM reagente ou conversão de IgG (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

9.2. Diabetes gestacional (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

9.3. Gestantes com alterações em exame de imagem (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

9.4. Gestantes com doença falciforme – preferencialmente HCPA e Conceição, (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

9.5. **PATOLOGIAS PRÉVIAS:** Hipertensão Arterial (Hipertensão Arterial na gravidez é Pressão Arterial (PA) sistólica maior ou igual 140 mmHg e/ou PA diastólica maior ou igual a 90 mmHg, antes da 20ª semana de idade Gestacional, medida em repouso de pelo menos 10 minutos); Nefropatias; Doenças Hematológicas; Lupus Eritematoso Sistêmico; Diabete Melitus Tipos I e II; Cardiopatia; Pneumopatia Grave; Doenças Neurológicas como a Epilepsia que necessitam de acompanhamento multidisciplinar; Qualquer patologia clínica que necessite acompanhamento de maior complexidade (**MÉDICO E ENFERMEIRO**).

9.6. **GESTAÇÃO ATUAL:** Isoimunização Rh; Hipertensão Arterial (Hipertensão Arterial na gravidez é Pressão Arterial (PA) sistólica maior ou igual 140 mmHg e /ou PA Diastólica maior ou igual a 90 mmHg , medida em repouso de pelo menos 10 minutos); Hemoglobina < 8; Diabete Gestacional; História Prévia de Doença Hipertensiva da Gestação, com mau resultado obstétrico



**Prefeitura de  
Porto Alegre**

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIREÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE  
ÁREA TÉCNICA DA SAÚDE DA MULHER  
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM



e ou perinatal (interrupção prematura da gestação, morte fetal intra-uterina, HELLP, Eclâmpsia, internação da mãe em UTI); Infecções pré-natais como a Rubéola e a Citomegalovirose adquiridas na gestação atual; Oligoidrâmnio Pré-termo (< ou igual há 36 semanas); Crescimento Intra-Uterino Restrito Pré-Termo; Desnutrição Materna severa; Drogadição e Alcoolismo (ver fluxo específico de gestante/doença mental); Gemelidade; Malformações Fetais ou arritmia fetal; Morte Intra-uterina ou perinatal em gestação anterior principalmente se for de causa desconhecida; Polidrâmnio; Placenta Prévia na gestação atual; Adolescentes com fatores de risco psicossocial (**MÉDICO E ENFERMEIRO**);

**10. Pré-Natal HIV:** gestante com diagnóstico de HIV/AIDS (médico e enfermei

Seguir descritivo mínimo e protocolo de encaminhamento TelessaúdeRS –  
[Protocolo de Encaminhamento para Obstetrícia \(Pré-Natal de Alto Risco\)](#)