

# CALENDÁRIO VACINAL - CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV E PACIENTES QUE VIVEM COM HIV/AIDS

## Bebês, Crianças e Adolescentes

CRIANÇA CONSIDERADA EXPOSTA<sup>10</sup>

<b>Ao nascer</b>	BCG <sup>1</sup> Hepatite B	Dose única Dose inicial
<b>2 meses</b>	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina oral rotavírus humano <sup>1</sup> Vacina pneumocócica 13 (CRIE)	1ª Dose
<b>3 meses</b>	Meningocócica ACWY	1ª Dose
<b>4 meses</b>	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina oral rotavírus humano <sup>1</sup> Vacina pneumocócica 13 (CRIE)	2ª Dose
<b>5 meses</b>	Meningocócica ACWY	2ª Dose
<b>6 meses</b>	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) Vacina poliomielite inativada (VIP) Vacina pneumocócica 13 (CRIE) Covid-19 *	3ª Dose 1ª Dose
<b>9 meses</b>	Febre Amarela <sup>1</sup>	1ª Dose
<b>12 meses</b>	Vacina pneumocócica 13 <sup>3</sup> (CRIE) Tríplice viral <sup>1,5</sup> Varicela <sup>1,5</sup> Hepatite A	Reforço 1ª Dose 1ª Dose 1ª Dose
<b>15 meses</b>	Pentavalente (DTP+Hib+ HB) <sup>2</sup> Vacina poliomielite inativada (VIP) Meningocócica ACWY <sup>3</sup> Tríplice viral <sup>1,5</sup> Varicela <sup>1,5</sup>	1º Reforço 1º Reforço 1º Reforço 2ª Dose 2ª Dose
<b>18 meses</b>	Hepatite A	2ª Dose
<b>24 meses</b>	Vacina pneumocócica 23 (CRIE)	1ª dose

- 1- Vacinas atenuadas somente serão administradas em pacientes imunocompetentes ou com liberação médica.  
 2- Recomenda-se a realização de sorologia Anti-HBs 30 a 60 dias após o término do esquema. Se anti AGHBs <10 UI/mL, repetir esquema de 4 doses com vacina hepatite B monovalente, com o dobro da dose. Pessoas não vacinadas previamente, usar o esquema de 4 doses da vacina HB monovalente, com o dobro da dose conforme o laboratório produtor para a faixa etária. É indicada retestagem anual de anti-HBs para verificar se encontra-se em níveis protetores. Caso esteja abaixo de 10mUI/mL, nova dose de reforço (com dose dobrada) deve ser aplicada e novamente checada a resposta vacinal após 30 a 60 dias.  
 3 - Criança acima dos 12 meses (PVC13) ou dos 15 meses (Men ACWY) sem comprovação desses imunos, realizar 2 doses com intervalo de 60 dias. Meningo ACWY realizar reforço a cada 5 anos, se HIV+ estratégia especial.  
 4 - Vacina *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) para maiores de 12 meses nunca vacinados.  
 5 - Crianças expostas ao HIV ou HIV+ não devem receber Tetraviral.  
 \* Covid-19: Esquema de 2 ou 3 doses de acordo com o laboratório disponível.



<b>4 anos</b>	Tríplice bacteriana (DTP) Vacina poliomielite inativada (VIP) Febre Amarela <sup>1</sup>	2º Reforço 2º Reforço Reforço
<b>5 anos</b>	Vacina pneumocócica 13 <sup>7</sup> (CRIE)	1ª Dose
<b>6 anos</b>	Meningocócica ACWY <sup>11</sup>	2º Reforço (realizar reforço a cada 5 anos)
<b>7 anos</b>	Vacina pneumocócica 23 (CRIE)	2ª Dose
<b>9 a 17 anos</b>	Hepatite B <sup>2</sup> Dupla Adulto (dT) HPV Meningocócica ACWY <sup>11</sup> (CRIE) Vacinas pneumocócicas <sup>7</sup> (CRIE) Hib <sup>4</sup> (CRIE) Febre Amarela <sup>1</sup> Tríplice viral <sup>1</sup> Varicela <sup>1</sup> (CRIE) Hepatite A <sup>6</sup> (CRIE)	4 doses (esquema 0, 1, 2 e 6 meses) 3 doses com intervalo de 60 dias (reforço a cada 10 anos) 3 doses (esquema 0, 2 e 6 meses) 2 doses com intervalo de 8 semanas e reforço a cada 5 anos Dose única com pneumo 13 <sup>7</sup> . Após 8 semanas realizar 1ª dose de pneumo 23 e uma 2ª dose 5 anos após 2 doses com intervalo de 60 dias Reforço ou dose única <sup>8</sup> 2 doses com 30 dias de intervalo mínimo 2 doses com 30 dias de intervalo 2 doses com 6 meses de intervalo

## Adultos

<b>Acima de 18 anos</b>	Hepatite B <sup>2</sup> Dupla Adulto (dT) Febre Amarela <sup>1</sup> Tríplice viral <sup>1</sup> Hib <sup>4</sup> (CRIE) Varicela (CRIE) <sup>1</sup> Hepatite A <sup>6</sup> (CRIE) Vacinas pneumocócicas <sup>7</sup> (CRIE) Meningocócica ACWY <sup>11</sup> (CRIE) HPV (até 45 anos de idade)	4 doses (esquema 0, 1, 2 e 6 meses) 3 doses com intervalo de 60 dias (reforço a cada 10 anos) Reforço ou dose única <sup>8</sup> 2 doses com 30 dias de intervalo mínimo 2 doses com intervalo de 60 dias 2 doses com 30 dias de intervalo 2 doses com 6 meses de intervalo Dose única com pneumo 13 <sup>7</sup> . Após 8 semanas realizar 1ª dose de Pneumo 23 e uma 2ª dose 5 anos após 2 doses com intervalo de 8 semanas e reforço a cada 5 anos 3 doses (esquema 0, 2 e 6 meses)
-------------------------	--	---

- 6 - Caso não tenha recebido previamente.  
 7 - Para caso não tenha recebido previamente a Pneumo 13.  
 8 - De acordo com a situação vacinal encontrada. Realizar reforço se tiver recebido somente uma dose antes dos 5 anos.  
 9 - O esquema vacinal contra Covid-19 está disponível a partir dos 6 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias  
 10 - Crianças expostas verticalmente ao HIV devem receber as vacinas indicadas nesse calendário até os 18 meses de idade. Após essa idade e excluída a infecção pelo HIV, devem seguir o esquema básico vacinal recomendado pelo PNI, à exceção da pólio (realizar 1 e 2º reforço de VIP - 15 meses e 4 anos) e influenza anualmente, por conviverem com pessoas com imunodeficiência.  
 11 - Pessoas com esquema completo de 2 doses de Meningo C devem refazê-lo com a ACWY, com intervalo de 8 semanas e reforço a cada 5 anos.

Atualização Janeiro/2025

